

TILL DIG SOM BEHANDLAS MED ONTOZRY®



Du har fått den här broschyren för att du ordinerats ONTOZRY® (cenobamat) för behandling av epilepsi.

Läs noga igenom bipacksedeln och följ anvisningarna du har fått av din läkare.

ONTOZRY®
cenobamat

▽ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning

Epilepsi är en sjukdom som drygt **81000 människor i Sverige** lever med¹ och som drabbar upp till 2 % av hela världens befolkning, vilket gör det till en av de vanligaste neurologiska sjukdomarna.² **Fokala anfall står för mer än 60 % av epilepsifallen** och dessa anfall svarar ofta sämre på behandling än generaliserade anfall.^{3,4}

Med tillgängliga behandlingar kan de flesta anfall kontrolleras. Men **cirka en tredjedel av alla personer med epilepsi uppnår inte anfallsfrihet** på grund av terapiresistens.⁵⁻⁷

Definition av terapiresistent epilepsi: Fortsatta epileptiska anfall trots behandling med minst två korrekt valda antiepileptiska läkemedel, i adekvata doser enskilt eller i kombination.¹

ONTOZRY används i kombination med andra antiepileptika hos vuxna patienter med epilepsi, som inte har uppnått tillräcklig anfallskontroll trots tidigare behandling med åtminstone två antiepileptiska läkemedel. ONTOZRY används för behandling av fokala anfall, med eller utan sekundär generalisering.⁸

1. Socialstyrelsen; Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi, artikelnummer 2019-2-8. 2. Chung S, et al. *Seizure*. 2007;16(4):296-304.
3. Schmitz B, et al. *Epilepsia*. 2010;51(11):2231-40. 4. Cockerell OC, et al. *Epilepsia*. 1997;38(1):31-46. 5. Chen Z, et al. *JAMA Neurol*. 2018;75(3):279-86.
6. Kwan P and Brodie MJ. *N Engl J Med*. 2000;342(5):314-9. 7. Kwan P et al. *Epilepsia*. 2010;51(6):1069-77. 8. Ontozry bipacksedel, fass.se.




2%

AV VÄRLDENS
BEFOLKNING



81000

MÄNNISKOR
I SVERIGE



60%

HAR FOKALA
ANFALL




1/3

UPPNÅR INTE
ANFALLSKONTROLL

HUR DU TAR ONTOZRY


Den rekommenderade dosen bör tas en gång dagligen vid ungefär samma tidpunkt.



STARTDOS

Den rekommenderade startdosen är 12,5 mg per dag.

Därefter kommer din dos att **justeras gradvis varannan vecka** tills du uppnår den dos som fungerar bäst för dig.



ADMINISTRATION

Tabletterna **sväljs hela** med ett glas vatten, **med eller utan mat**.

Bryt inte tabletterna i halvor, eftersom tabletterna inte är lämpliga att delas.

Vid behov kan tabletterna krossas. Krossade tabletter kan blandas med vatten och sväljas eller ges via nasogastrisk sond. Läs mer i bipacksedeln och följ anvisningarna du har fått av din läkare.



OM DU GLÖMT ATT TA EN DOS

Om det har gått **mindre än 12 timmar** sedan du skulle ha tagit dosen, **ta dosen så snart du kan**.

Om det har gått **mer än 12 timmar**, **hoppa över den glömda dosen** och ta nästa dos vid din vanliga tid. **Ta inte dubbel dos** för att kompensera för den du missat.


REKOMMENDERAD DOS

Den rekommenderade startdosen är 12,5 mg under de första 2 veckorna. Dosen ökas sedan gradvis tills du uppnår den dos som fungerar bäst för dig. Rekommenderad dos är mellan 200 mg och 400 mg en gång dagligen.¹

Om du slutar ta ONTOZRY

Du ska inte minska dosen eller sluta ta ONTOZRY utan att kontrollera med din läkare. Din läkare kommer att förklara hur du ska avsluta behandlingen med ONTOZRY genom att minska dosen gradvis.

UPPTRAPPNING AV DOSEN



EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Ontozry används i kombination med andra antiepileptika. Om Ontozry tas samtidigt med vissa andra läkemedel, kan detta påverka hur de andra läkemedlen fungerar eller hur Ontozry fungerar, och din dos eventuellt måste justeras. Börja inte ta och sluta inte ta andra läkemedel utan att först tala med läkare eller apotekspersonal.¹



Precis som alla läkemedel kan ONTOZRY orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.



Om du får biverkningar, **tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.**



Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):!

- Sömnighet (somnolens), trötthet eller kraftig trötthet (utmattning)
- Yrsel, ostadighetskänsla (vertigo)
- Problem med samordning av rörelser, gångsvårigheter eller balanssvårigheter (ataxi, gångstörningar, onormal koordination)
- Huvudvärk



Tala omedelbart om för din läkare

om du upplever någon av dessa ovanliga biverkningar:

- Allvarlig hudreaktion, som kan inkludera feber och andra influensaliknande symtom
- Utslag i ansiktet, utslag som sprider sig till andra områden på kroppen och svullna körtlar (förstorade lymfkörtlar).
- Blodprover kan visa förhöjda nivåer av leverenzymmer och av en typ av vita blodkroppar (eosinofili).

* För hela listan av biverkningar, läs bipacksedeln.

1. Ontozry bipacksedel, fass.se.

4 UTSEENDE OCH FÖRPACKNINGSG- STORLEKAR

SÅ LEVERERAS ONTOZRY¹

Start- och titreringsförpackningar för enkel dostitrering varannan vecka.

Startförpackningar (28 dagar)

- 14 st. tabletter cenobamat 12,5 mg
- 14 st. filmdragerade tabletter med cenobamat 25 mg

Titreringsförpackningar (att använda tills optimal dos är uppnådd)

- 14 st. filmdragerade tabletter cenobamat 50 mg
- 14 st. filmdragerade tabletter cenobamat 100 mg
- 14 st. filmdragerade tabletter cenobamat 150 mg
- 14 st. filmdragerade tabletter cenobamat 200 mg
- Din dos kommer att justeras gradvis varannan vecka tills du når den dos som fungerar bäst. Din läkare kommer att ge dig rätt daglig dos, och denna kan behöva justeras med tiden.

Förpackningar för underhållsbehandling

- Den rekommenderade måldosen för ONTOZRY är 200 mg
- Beroende på kliniskt svar, kan dosen ONTOZRY höjas till maximalt 400 mg per dag

Tillgängliga förpackningar

- ONTOZRY 50 mg, 28 st. filmdragerade tabletter
- ONTOZRY 100 mg, 28 st. filmdragerade tabletter
- ONTOZRY 150 mg, 28 st. filmdragerade tabletter
- ONTOZRY 200 mg, 28 st. filmdragerade tabletter



Tabletterna visas i sin naturliga storlek

1. Ontozry bipacksedel, fass.se.



Besök brainpower.se för mer information om epilepsi!

BrainPower är samlingsplatsen för allt som har med epilepsi att göra. Den är för alla som letar efter gemenskap, förståelse och information om ett sällan diskuterat tillstånd.

SKANNA QR-KODEN

