TILL DIG SOM BEHANDLAS MED ONTOZRY®



Du har fått den här broschyren för att du ordinerats ONTOZRY® (cenobamat) för behandling av epilepsi.

Läs noga igenom bipacksedeln och följ anvisningarna du har fått av din läkare.

ONTOZRY®
cenobamat

▽ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning

Epilepsi är en sjukdom som drygt **81 000 människor i Sverige** lever med[1] och som drabbar upp till 2 % av hela världens befolkning, vilket gör det till en av de vanligaste neurologiska sjukdomarna.[2] **Fokala anfall står för mer än 60 % av epilepsifallen** och dessa anfall svarar ofta sämre på behandling än generaliserade anfall.[3,4]

Med tillgängliga behandlingar kan de flesta anfall kontrolleras. Men **cirka en tredjedel av alla personer med epilepsi uppnår inte anfallsfrihet** på grund av terapiresistens.[5-7]

Definition av terapiresistent epilepsi: Fortsatta epileptiska anfall trots behandling med minst två korrekt valda epilepsiläkemedel, i adekvata doser enskilt eller i kombination.[1]

ONTOZRY används i kombination med andra antiepileptika hos vuxna patienter med epilepsi, som inte har uppnått tillräcklig anfallskontroll trots tidigare behandling med åtminstone två antiepileptiska läkemedel. ONTOZRY används för behandling av fokala anfall, med eller utan sekundär generalisering.[8]

1. Socialstyrelsen; Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi, artikelnummer 2019-2-8. **2.** Chung S, *et al. Seizure*. 2007;16(4):296-304.
3. Schmitz B, *et al. Epilepsia*. 2010;51(11):2231-40. **4.** Cockerell OC, *et al. Epilepsia*. 1997;38(1):31-46. **5.** Chen Z, *et al. JAMA Neurol*. 2018;75(3):279-86.
6. Kwan P and Brodie MJ. *N Engl J Med*. 2000;342(5):314-9. **7.** Kwan P *et al. Epilepsia*. 2010;51(6):1069-77. **8.** Ontozry bipacksedel, fass.se.

DU ÄR INTE ENSAM

2 %
AV VÄRLDENS BEFOLKNING HAR EPILEPSI

81 000
MÄNNISKOR I SVERIGE HAR EPILEPSI

1/3
UPPNÅR INTE ANFALLSKONTROLL

VARFÖR HAR DU FÅTT ONTOZRY?

Efter att ha gått igenom din situation har din läkare beslutat att förskriva ett annat läkemedel, ONTOZRY®, för att hjälpa till att kontrollera och minska anfall som uppstår i en specifik del av hjärnan (fokala anfall). Målet är att förbättra anfallskontrollen och bidra till en bättre vardag.

När din läkare bedömer ditt tillstånd kommer noggran hänsyn tas till:

- Hur väl dina nuvarande läkemedel fungerar för att kontrollera din epilepsi
- Hur svåra och intensiva dina anfall är
- Om det tar lång tid för dig att återhämta dig efter ett anfall
- Vilka biverkningar du eventuellt upplever av din nuvarande behandling
- Om vårdteamet kan förbättra ditt nuvarande tillstånd

Som du kan se finns det många faktorer som din läkare eller sjuksköterska behöver ta hänsyn till.Det är förståeligt att förändringar i behandlingen kan få dig att känna dig orolig eller förvirrad, men du kommer inte att få ONTOZRY® om inte din läkare eller sjuksköterska bedömer att du kan ha nytta av behandlingen.

HUR DU TAR ONTOZRY

Den rekommenderade dosen bör tas en gång dagligen vid ungefär samma tidpunkt.

Ta ONTOZRY® enligt läkarens eller sjuksköterskans anvisningar. Det kan vara lätt att glömma att ta sina läkemedel, särskilt om du har en hektisk vardag eller tar flera olika läkemedel vid olika tider på dagen. Med tiden kan det bli en naturlig del av din dagliga rutin att ta ONTOZRY® enligt ordination.

Gör det till en vana att ta din(a) tablett(er) vid samma tidpunkt varje dag


Till exempel:

- Efter att du har borstat tänderna på morgonen
- Efter frukost
- Precis innan du går och lägger dig

Tillsammans med din läkare kan du komma fram till vilken tid på dagen som är bäst för dig att ta Ontozry.

Praktiska tips


- Sätt ett larm eller en påminnelse i mobilen
- Två kommer ihåg bättre än en: Be en familjemedlem eller vän som du litar på att hjälpa dig att komma ihåg att ta din medicin
- Förvara tabletterna på en lättillgänglig plats: ONTOZRY® har inga särskilda förvaringsanvisningar, så du kan förvara det tillsammans med dina andra läkemedel. Se till att läkemedlen förvaras utom syn- och räckhåll för barn och att du enkelt kan skilja dem åt.



STARTDOS

Den rekommenderade startdosen är 12,5 mg per dag.

Därefter kommer din dos att **justeras gradvis varannan vecka** tills du uppnår den dos som fungerar bäst för dig.



ADMINISTRATION

Tabletterna **sväljs hela** med ett glas vatten, **med eller utan mat.**

Bryt inte tabletterna i halvor, eftersom tabletterna inte är lämpliga att delas.

Vid behov kan tabletterna krossas. Krossade tabletter kan blandas med vatten och sväljas eller ges via naso-gastrisk sond. Läs mer i bipacksedeln och följ anvisningarna du har fått av din läkare.



OM DU GLÖMT ATT TA EN DOS

Om det har gått **mindre än 12 timmar** sedan du skulle ha tagit dosen, **ta dosen så snart du kan**
Om det har gått **mer än 12 timmar, hoppa över den glömda dosen** och ta nästa dos vid din vanliga tid.
Ta inte dubbel dos för att kompensera för den du missat.

1. Ontozry bipacksedel, fass.se.

2 REKOMMENDERAD DOS

Redo att komma igång?

Det första steget är att genomföra upptrappningsperioden (titreringen). Det innebär att ditt vårdteam börjar med den lägsta dosen av ONTOZRY®

Den rekommenderade startdosen är 12,5 mg under de första 2 veckorna. Dosen ökas sedan gradvis tills du uppnår den dos som fungerar bäst för dig. Rekommenderad dos är mellan 200 mg och 400 mg en gang dagligen.[1]


Titrering hjälper till att minska risken för möjliga biverkningar genom att ge kroppen tid att anpassa sig och visa hur den reagerar på läkemedlet. Din läkare eller sjuksköterska kan besluta att trappa ned dosen om du får biverkningar som är svåra att tolerera.

Om du slutar ta ONTOZRY

- Du ska inte minska dosen eller sluta ta ONTOZRY utan att kontrollera med din läkare.
- Din läkare kommer att förklara hur du ska avsluta behandlingen.

Viktigt att veta: läkaren kommer att ta blodprover för att kontrollera din leverfunktion innan du påbörjar behandling med Ontozry och under behandling med Ontozry. Kontakta läkare eller apotekare omedelbart om du upplever plötsligt illamående och detta åtföljs av en eller några av de möjliga tecken på allvarlig leverskada. Läs bipackningsedeln för mer information.

UPPTRAPPNING AV DOSEN



1. Ontozry bipacksedel, fass.se.

3 EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Vad gäller för läkemedelssäkerhet?

Precis som alla läkemedel kan ONTOZRY orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Ontozry används i kombination med andra epilepsiläkemedel. Om Ontozry tas samtidigt med vissa andra läkemedel, kan detta påverka hur de andra läkemedlen fungerar eller hur Ontozry fungerar, och din dos eventuellt måste justeras.

Börja inte ta och sluta inte ta andra läkemedel utan att först tala med läkare eller apotekspersonal.[1]

Läs mer

- Du kan hitta mer säkerhetsinformationinformation om ONTOZRY® i bipacksedeln i din förpackning med ONTOZRY®



Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):[1]

- Sömnighet (somnolens), trötthet eller kraftig trötthet (utmattning)
- Yrsel, ostadighetskänsla (vertigo)
- Problem med samordning av rörelser, gångsvårigheter eller balans-svårigheter (ataxi, gångstörningar, onormal koordination)
- Huvudvärk



Följande biverkningar är sällsynta, men det är viktigt att du **omedelbart informerar din läkare** om du upplever någon av dessa ovanliga biverkningar[1]:

- Allvarlig hudreaktion, som kan inkludera feber och andra influensa-liknande symtom
- Utslag i ansiktet, utslag som sprider sig till andra områden på kroppen och svullna körtlar (förstorade lymfkörtlar).
- Blodprover kan visa förhöjda nivåer av leverenzymer och av en typ av vita blodkroppar (eosinofili).

Din läkare kommer också att ge dig råd om dessa tecken och hålla utkik efter hudreaktioner.



Om du får biverkningar, **tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.**



Informera din läkare om du upplever plötslig sjukdomkänsla, särskilt om den inkluderar:

- Illamående, upprepade kräkningar
- Extrem trötthet, buksmärtor, dåsighet, svaghet, aptitlöshet, smärta i övre delen av magen,
- Gulsot (gulfärgning av hud och ögonvitor), ovanligt mörk urin, ljus och lerfärgad avföring e
- Ller om du får blåmärken lättare än normalt.

Detta kan vara tecken på allvarlig leverskada.

***** För hela listan av biverkningar, läs bipacksedeln.

1. Ontozry bipacksedel, fass.se.

4 UTSEENDE OCH FÖRPACKNINGS-STORLEKAR

Ontozry erbjuds i start- och titreringsförpackningar som gör det enkelt att titrera dosen varannan vecka. Din läkare informerar om lämpliga förpackningsstorlekar i samband med den individuella titreringsplanen.

Ta hand om din medicin

- Det finns inga särskilda förvaringskrav för ONTOZRY®, så du kan förvara dem i rumstemperatur.
- Förvaras utom räckhåll och synhåll för barn. Se till att du inte använder något läkemedel som har gått ut – kontrollera utgångsdatumet på förpackningen.

Ta hand om din miljö

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används.

SÅ LEVERERAS ONTOZRY[1]

Start- och titreringsförpackningar för enkel dostitrering varannan vecka.

Startförpackningar (28 dagar)

- 14 st. tabletter cenobamat 12,5 mg
- 14 st. filmdragerade tabletter med cenobamat 25 mg

Titreringsförpackningar (att använda tills optimal dos är uppnådd)

- 14 st. filmdragerade tabletter cenobamat 50 mg
- 14 st. filmdragerade tabletter cenobamat 100 mg
- 14 st. filmdragerade tabletter cenobamat 150 mg
- 14 st. filmdragerade tabletter cenobamat 200 mg
- Din dos kommer att justeras gradvis varannan vecka tills du når den dos som fungerar bäst. Din läkare kommer att ge dig rätt daglig dos, och denna kan behöva justeras med tiden.

Förpackningar för underhållsbehandling

- Den rekommenderade måldosen för ONTOZRY är 200 mg
- Beroende på kliniskt svar, kan dosen ONTOZRY höjas till maximalt 400 mg per dag

Tillgängliga förpackningar

- ONTOZRY 50 mg, 28 st. filmdragerade tabletter
- ONTOZRY 100 mg, 28 st. filmdragerade tabletter
- ONTOZRY 150 mg, 28 st. filmdragerade tabletter
- ONTOZRY 200 mg, 28 st. filmdragerade tabletter



Tabletterna visas i sin naturliga storlek

1. Ontozry bipacksedel, fass.se.

ONTOZRY®
cenobamat

Besök brainpower.se för mer information om epilepsi!

BrainPower är samlingsplatsen för allt som har med epilepsi att göra. Den är för alla som letar efter gemenskap, förståelse och information om ett sällan diskuterat tillstånd.

SKANNA QR-KODEN

Angelini Pharma Nordics, nordic.medinfo@angelinipharma.com

Angelini Pharma

MAT-SE-0089-P 26.8.2026